

D-MATH

Prüfung Mathematik III

401-0293-00S

Nachname

XX

Vorname

XX

Legi-Nr.

XX-000-000

Prüfungs-Nr.

000

Bitte noch nicht umblättern!

Beachten Sie die Hinweise auf dem Antwortheft.

Aufgabe 1

1.MC1 [2 Punkte] Wir betrachten das DGL-System

$$x'(t) = Ax(t), \quad t \geq 0, \quad \text{wobei } A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Es gilt $A = PDP^{-1}$ mit

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann ist die Lösung $t \mapsto x(t)$ des DGL-System, mit Anfangswert $x(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, gegeben durch


(A) $x(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} + e^{-t} \\ -e^{-3t} + e^{-t} \end{pmatrix}$

(B) $x(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} + e^{-t} \\ -e^{-3t} + e^{-t} \end{pmatrix}$

(C) $x(t) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{3}t} \\ e^{-\frac{1}{3}t} \end{pmatrix}$

(D) $x(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} \\ 1 - e^{-t} \end{pmatrix}$

1.MC2 [2 Punkte] Es seien a, b, c, d, f positive reelle Zahlen. Wir betrachten das folgende Kompartimentmodell mit Kompartimenten K_1, K_2 und K_3 :



Die Stoffmengen einer Substanz zur Zeit $t \geq 0$ in den einzelnen Kompartimenten seien gegeben durch die Funktionen $t \mapsto Y_i(t)$, $i \in \{1, 2, 3\}$. Das Kompartimentmodell wird durch das folgende DGL-System beschrieben

$$Y'(t) = AY(t), \quad t \geq 0, \quad \text{wobei } A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Welche Matrix A passt zum obigen Kompartimentmodell?

(A) $A = \begin{pmatrix} -(a+b) & 0 & d \\ b & -c & 0 \\ 0 & c & -(d+f) \end{pmatrix}$

(B) $A = \begin{pmatrix} -a & b & d \\ 0 & -(b+f) & c \\ 0 & 0 & -(c+d) \end{pmatrix}$

(C) $A = \begin{pmatrix} -a & b & d \\ 0 & -(b+f) & c \\ b & 0 & -(c+d) \end{pmatrix}$

(D) $A = \begin{pmatrix} -a & b & d \\ 0 & -(b+d) & a \\ 0 & 0 & -(c+d) \end{pmatrix}$

1.MC3 [2 Punkte] Sei $y' = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ein inhomogenes lineares System.

Für welches $y_{\infty,2}$ ist $y_{\infty} = \begin{pmatrix} 1 \\ y_{\infty,2} \end{pmatrix}$ eine stationäre Lösung?

(A) $y_{\infty,2} = \frac{1}{2}$

(B) $y_{\infty,2} = 1$

(C) $y_{\infty,2} = 0$

(D) $y_{\infty,2} = -1$

1.A1 Die Matrix A sei gegeben durch

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

(i) **[2 Punkte]** Bestimmen Sie das Matrix-Exponential e^{tA} für $t \geq 0$.

Hinweis: Berechnen Sie zuerst $T^{-1}AT$, wobei die Matrizen T und T^{-1} gegeben sind durch

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(ii) **[1 Punkt]** Bestimmen Sie die Lösung der DGL

$$x'(t) = Ax(t), \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Notieren Sie Ihre Lösungen **in Ihrem Answerheft unter Aufgabennummer 1.A1.**

1.A2 Wir betrachten die Differentialgleichung

$$x'' - 2x' + x = 0. \tag{DG}$$

(i) **[1 Punkt]** Sei nun $y(t) = (x(t), x'(t))^T$, wobei x eine Lösung von (DG) ist. Bestimmen Sie eine Matrix A , so dass gilt

$$y'(t) = Ay(t).$$

(ii) **[2 Punkte]** Bestimmen Sie ein Fundamentalsystem von (DG).

Notieren Sie Ihre Lösungen **in Ihrem Answerheft unter Aufgabennummer 1.A2.**

Aufgabe 2

2.MC1 [2 Punkte] Die Funktion $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ sei gegeben durch $g(t) = t^2 2^t$. Dann ist die Laplacetransformation $\mathcal{L}[g]$ gegeben durch:

(A) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{2}{(s - \ln(2))^3}$

(B) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s^3}$

(C) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{2}{(s - \ln(2))^2}$

(D) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s^2 - \ln(2)}$

2.MC2 [2 Punkte] Die Funktion $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ sei gegeben durch $g(t) = (t - 3)^2 \vartheta(t - 3)$, wobei

$$\vartheta(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Dann ist die Laplace-Transformation $\mathcal{L}[g]$ gegeben durch:

(A) $\mathcal{L}[g](s) = e^{-3s} \frac{2}{s^3}$

(B) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{2}{s^2}$

(C) $\mathcal{L}[g](s) = e^{-3s}$

(D) $\mathcal{L}[g](s) = e^{-s} \frac{2}{s^3}$

2.MC3 [2 Punkte] Die Funktion $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ sei gegeben durch $g(t) = t^{7/2}$. Es gilt

$$\mathcal{L}[t^{5/2}](s) = \frac{15\sqrt{\pi}}{8s^{7/2}}.$$

Dann ist die Laplace-Transformation von $\mathcal{L}[g]$ gegeben durch

(A) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{105\sqrt{\pi}}{16s^{9/2}}$

(B) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{105\sqrt{\pi}}{8s^{5/2}}$

(C) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{15\sqrt{\pi}}{s^{9/2}}$

(D) $\mathcal{L}[g](s) = \frac{\sqrt{\pi}}{s^{7/2}}$

2.A1 [3 Punkte] Bestimmen Sie die inverse Laplace-Transformation von $F(s) = \frac{1}{(s+3)(s+4)}$.

Notieren Sie Ihre Lösungen **in Ihrem Answerheft unter Aufgabennummer 2.A1.**

2.A2 [3 Punkte] Bestimmen Sie die Lösung des folgenden Anfangswertproblems

$$\ddot{x}(t) + 3\dot{x}(t) + 2x(t) = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1$$

unter Verwendung der Laplace-Transformation.

Notieren Sie Ihre Lösungen **in Ihrem Answerheft unter Aufgabennummer 2.A2.**

Aufgabe 3

3.MC1 [2 Punkte] Sei f die Funktion mit $f(x) = dx^2 + 1$, einer Konstante d und $x \in [-1, 1]$. Für welches d hat die 2-periodische Fortsetzung von der Funktion f den Fourier-Koeffizienten $a_0 = 4$?

- (A) $d = 3$
- (B) $d = 2$
- (C) $d = 1$
- (D) $d = 0$

3.MC2 [2 Punkte] Sei $f : [-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x \cos(x)$ eine Funktion, die wir 2π -periodisch nach \mathbb{R} fortsetzen. Weiterhin sei $F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ die Fourier-Reihe zur Funktion von f . Dann gilt

- (A) $a_n = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$
- (B) $b_n = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$
- (C) $a_0 = \frac{\pi}{2}$
- (D) $b_1 = \pi$

3.MC3 [2 Punkte] Sei $f : [-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x + \pi$ eine Funktion, die wir 2π -periodisch nach \mathbb{R} fortsetzen. Dann kann f auf ganz \mathbb{R} als Fourier-Reihe dargestellt werden. Welchen Wert nimmt die Fourier-Reihe von f an der Sprung-Stelle $x = \pi$ an?

- (A) π
- (B) 1
- (C) -1
- (D) 2

3.A1 [3 Punkte] Sei $f : [-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2$ eine Funktion, die wir 2π -periodisch nach \mathbb{R} fortsetzen. Berechnen Sie die reellen Fourierkoeffizienten $(a_n)_{n \geq 0}$ und $(b_n)_{n \geq 1}$. Notieren Sie Ihre Lösungen **in Ihrem Antwortheft unter Aufgabennummer 3.A1.**

3.A2 [3 Punkte] Sei $g : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) = e^{-x}$ für $x \in [0, 1[$ eine Funktion, die wir 1-periodisch nach \mathbb{R} fortsetzen. Berechnen Sie die komplexen Fourier-Koeffizienten $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ der Fourier-Reihe von g .

Notieren Sie Ihre Lösungen **in Ihrem Antwortheft unter Aufgabennummer 3.A2.**

Aufgabe 4

4.MC1 [2 Punkte] Es sei $u : \overline{B_1(0)} \rightarrow \mathbb{R}$ eine nicht konstante harmonische Funktion, wobei $\overline{B_1(0)} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Wir betrachten u in Polarkoordinaten und es gelte die Randbedingung

$$u(1, \varphi) = 3(\cos(\varphi))^2, \quad \text{für } \varphi \in [0, 2\pi).$$

Dann ist das Maximum der Funktion u auf $\overline{B_1(0)}$ gegeben durch

- (A) 3
- (B) -1
- (C) 0
- (D) 2

4.MC2 [2 Punkte] Es sei $u : \overline{B_1(0)} \rightarrow \mathbb{R}$ eine nicht konstante harmonische Funktion. Wir betrachten u in Polarkoordinaten und es gelte die Randbedingung

$$u(1, \varphi) = \begin{cases} 4 & \text{wenn } 0 \leq \varphi < \pi \\ 0 & \text{wenn } \pi \leq \varphi < 2\pi \end{cases}$$

Dann ist $u(0, 0)$ gegeben durch

- (A) 2
- (B) -1
- (C) 0
- (D) $\frac{1}{2}$

4.MC3 [2 Punkte] Für $k \in \mathbb{R}$, definieren wir die Funktion

$$u : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ (t, x) \mapsto \sin(kx - t).$$

Die Wellengleichung ist gegeben durch

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Welche der folgenden Gleichungen gilt für den Parameter k , wenn u die Wellengleichung erfüllt?

- (A) $k^2 = 1$
- (B) $k = 3$
- (C) $k = -2$
- (D) $k^2 = 4$

4.A1 [6 Punkte] Die Wärmeleitungsgleichung ist gegeben durch

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x), \text{ für } 0 < x < \pi \text{ und } t > 0. \quad (\text{PDE})$$

Ausserdem, gelten die Rand und Anfangsbedingungen

$$u(t, 0) = u(t, \pi) = 0 \quad \text{für } t \geq 0, \quad (\text{RB})$$

$$u(0, x) = 2 \sin(3x), \quad \text{für } 0 < x < \pi. \quad (\text{AB})$$

- (i) Führen Sie den Separationsansatz $u(x, t) = f(t)g(x)$ in (PDE) durch, um je eine gewöhnliche Differentialgleichung für f und g zu erhalten. Achten Sie darauf, dass für g periodische Funktionen gesucht werden. Beachten Sie ausserdem, dass die Lösungen der Differentialgleichungen nicht konstant gleich Null sind. Schreiben Sie die allgemeinen Lösungen explizit auf.
- (ii) Bestimmen Sie die Lösungen g_n der Differentialgleichung für g , so dass die Randbedingung $g_n(0) = g_n(\pi) = 0$ gilt. Beachten Sie ausserdem, dass die Lösungen g_n nicht konstant gleich Null sind.
- (iii) Schreiben Sie die Fundamentallösungen $u_n(t, x) = f_n(t)g_n(x)$, welche (PDE) and (RB) erfüllen, explizit auf.
- (iv) Finden Sie durch Superposition der Fundamentallösungen, also mit dem Ansatz

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n u_n(t, x), \quad D_n \in \mathbb{R}$$

die Lösung von (PDE), welche die Anfangsbedingung (AB) und die Randbedingung (RB) erfüllt. Schreiben Sie die Lösung explizit hin.

Notieren Sie Ihre Lösungen **in Ihrem Antwortheft unter Aufgabennummer 4.A1**.