Modallogik

Seminarvortrag ETHZ-GESS:

Logik: Von Aristoteles bis Gödel (FS16)

18.5.2016

Philipp Schmocker & Stephan Allenspach

Ablauf

- Teil I: Modallogik
 - Einführung und Definitionen
 - Normalsystem
 - Modallogische Systeme
- Teil II: Semantik der Modallogik
 - Einführung und Definitionen
 - Theoreme
 - Beziehung zwischen den Modallogische Systemen und Frames

Notation

(1) Aussagenvariablen: A, B, C

(2) Nicht-logische Zeichen: „(“ und „)“

(3) Junktoren:

➤ Zweistellig: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ (Bsp: $A \wedge B$)

➤ Einstellig: $\neg$ (Bsp: $\neg A$)

➤ Nullstellig: $\perp, \top$

➤ Wir können aus $\rightarrow$ und $\perp$ alle anderen Junktoren konstruieren [Bsp. $\neg p$ ist äquivalent zu $(p \rightarrow \perp)$]

Definition Modalsätze

(3) Modaloperatoren:

- Notwendig („In **allen** möglichen Welten gilt“): $\Box$
- Möglich („In **einer** möglichen Welten gilt“): $\Diamond$

- $\Diamond$ (bzw. $\Box$) und $\neg$ kommutieren nicht:
 - $\Diamond \neg p$ (Bsp: Es ist möglich, dass Sokrates nichts weiss)
 - $\neg \Diamond p$ (Bsp: Es ist nicht möglich, dass Sokrates etwas weiss)
- Wir können $\Diamond$ aus $\Box$ konstruieren:
 - $\Diamond p$ ist äquivalent zu $\neg \Box \neg p$

Definition Modalsätze

- Wir betrachten Sequenzen aus den Objekten
 - a) $\perp, \rightarrow, \Box$ [bzw. $\neg, \leftrightarrow, \wedge, \vee$] und „(“ & „)“
 - b) Atomare Sätze (p,q etc. als Variablen für diese)
- Definitionen:
 - (1) $\perp$ ist ein Modalsatz
 - (2) Jeder atomarer Satz ist ein Modalsatz
 - (3) A und B Modalsätze, dann $(A \rightarrow B)$ ein Modalsatz
 - (4) A Modalsatz, dann $\Box(A)$ auch ein Modalsatz

Definition System

- Ein System der Modallogik besteht aus
 - a) Einer Menge von Modalsätzen (Axiome)
 - b) Einer Menge von Schlussregeln (Rules of Inference)
- Ein Beweis besteht aus einer endlichen Anzahl Sequenzen von Modalsätzen, welche aufgebaut sind aus
 - a) Axiomen
 - b) Bereits hergeleiteten Modalsätzen („Theoreme“)
- Notation:
 - $L \vdash A$ heisst: A ist ein Theorem des Systems L

Schlussfolgerungen

➤ Modus Ponens:

$$\frac{A, A \rightarrow B}{B}$$

➤ Alternativ: $\langle (A \rightarrow B), A, B \rangle$

➤ Vernetwendigung („Necessitation“):

➤ Wenn $L \vdash A$ dann auch $L \vdash \Box A$

➤ Alternativ: $\langle A, \Box A \rangle$

Distributionsaxiom

➤ Das Distributionsaxiom hat die Form:

➤ $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

➤ Bsp:

➤ A: Es regnet

➤ B: Die Strasse wird nass

➤ $\Box(A \rightarrow B)$: In allen möglichen Welten gilt, dass falls es regnet die Strasse nass wird

➤ $(\Box A \rightarrow \Box B)$: Falls es in allen möglichen Welten regnet, wird in allen möglichen Welten die Strasse nass

Substitution

- Sei F ein Modalsatz
- Wir schreiben $F_p(A)$ für die *Substitution von A für p in F*
- Bsp:
 - $F = (p \rightarrow \neg p)$
 - $A = q_1 \wedge q_2$
$$F_p(A) = A \rightarrow \neg A = (q_1 \wedge q_2) \rightarrow \neg(q_1 \wedge q_2)$$

$$= (q_1 \wedge q_2) \rightarrow (\neg q_1 \vee \neg q_2)$$
- Definitionen:
 - (1) Wenn $F = p$, dann $F_p(A) = A$
 - (2) Wenn $F = q$ ($q \neq p$), dann $F_p(A) = q$
 - (3) Wenn $F = \perp$, dann $F_p(A) = \perp$
 - (4) $(F \rightarrow G)_p(A) = F_p(A) \rightarrow G_p(A)$ und $(\Box F)_p(A) = \Box(F_p(A))$

Die 7 Modallogischen Systeme

- Für jedes dieser 7 System gilt:
 - Sie beinhalten alle Tautologien
 - Das Distributionsaxiom gehört dazu
 - Die Schlussregeln sind Modus Ponens und Verortwendigung

- K: Hat sonst keine Axiome
- K4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$
- T: $\Box A \rightarrow A$
- S4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$ & $\Box A \rightarrow A$
- B: $\Box A \rightarrow A$ & $A \rightarrow \Box \Diamond A$
- S5: $\Box A \rightarrow A$ & $\Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$
- GL: $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$

Normalsysteme

- Ein System wird *normal* genannt, wenn
 - (1) Die Menge seiner Theoreme alle Tautologien und das Distributionsaxiom enthält
 - (2) Es abgeschlossen ist unter Modus Ponens, Vernotwendigung und Substitutionen
- Die Kripke-Semantik „K“ ist ein Normalsystem
- Somit sind auch alle Erweiterungs-Systeme (von K) Normalsysteme

Die 7 Modallogischen Systeme

- Im Folgenden nehmen wir an: L sei ein normales System
- **Theorem 1:** Wir nehmen an $L \vdash A \rightarrow B$, dann gilt $L \vdash \Box A \rightarrow \Box B$
- *Beweis:*
 - Vernetwendigung: $L \vdash \Box(A \rightarrow B)$
 - Distributionsaxiom: $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow \Box A \rightarrow \Box B$
- **Theorem 2:** Wir nehmen an $L \vdash A \leftrightarrow B$, dann gilt $L \vdash \Box A \leftrightarrow \Box B$
- *Beweis:*
 - Logische Umformung: $L \vdash A \rightarrow B$ und $L \vdash B \rightarrow A$
 - Theorem 1: $L \vdash \Box A \rightarrow \Box B$ und $L \vdash \Box B \rightarrow \Box A$
 - Logische Umformung: $L \vdash \Box A \leftrightarrow \Box B$

Die 7 Modallogischen Systeme

➤ **Theorem 3:** $L \vdash \Box(A \wedge B) \leftrightarrow (\Box A \wedge \Box B)$

➤ *Beweis:*

➤ Wir zeigen zuerst $\rightarrow$:

➤ Es gilt $L \vdash (A \wedge B) \rightarrow A$ und $L \vdash (A \wedge B) \rightarrow B$

➤ Theorem 1: $L \vdash \Box(A \wedge B) \rightarrow \Box A$ und $L \vdash \Box(A \wedge B) \rightarrow \Box B$

➤ Was wir umschreiben zu $L \vdash \Box(A \wedge B) \rightarrow (\Box A \wedge \Box B)$

➤ Nun zeigen wir $\leftarrow$:

➤ Es gilt $L \vdash A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$

➤ Theorem 1: $L \vdash \Box A \rightarrow \Box(B \rightarrow (A \wedge B))$

➤ Distributionsaxiom: $\Box(B \rightarrow (A \wedge B)) \rightarrow \Box B \rightarrow \Box(A \wedge B)$

➤ Somit $L \vdash \Box A \rightarrow \Box(A \wedge B)$ [vertausche A&B: $\Box B \rightarrow \Box(A \wedge B)$]

➤ Was wir umschreiben zu $(\Box A \wedge \Box B) \rightarrow \Box(A \wedge B)$

Die 7 Modallogischen Systeme

- Man kann zeigen, dass sich die Struktur des Diagramms (durch fortfahren mit der „Theorem-Sequenz“) umformen lässt

- Repetition

- K: Hat sonst keine Axiome
- K4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$
- T: $\Box A \rightarrow A$
- S4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$ & $\Box A \rightarrow A$
- B: $\Box A \rightarrow A$ & $A \rightarrow \Box \Diamond A$
- S5: $\Box A \rightarrow A$ & $\Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$
- GL: $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$

Die 7 Modallogischen Systeme

- Man kann zeigen, dass sich die Struktur des Diagramms (durch fortfahren mit der „Theorem-Sequenz“) umformen lässt

- Repetition

- K: Hat sonst keine Axiome
- K4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$
- T: $\Box A \rightarrow A$
- S4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$ & $\Box A \rightarrow A$
- B: $\Box A \rightarrow A$ & $A \rightarrow \Box \Diamond A$
- S5: $\Box A \rightarrow A$ & $\Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$
- GL: $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$

Die 7 Modallogischen Systeme

➤ **Theorem 18:** $GL \vdash \Box A \rightarrow \Box \Box A$

➤ *Beweis:*

➤ Tautologie: $GL \vdash A \rightarrow \{(\Box \Box A \wedge \Box A) \rightarrow (\Box A \wedge A)\}$

➤ Theorem 3: $GL \vdash A \rightarrow \{\Box(\Box A \wedge A) \rightarrow (\Box A \wedge A)\}$

➤ Theorem 2: $GL \vdash \Box A \rightarrow \Box \{ \underbrace{\Box(\Box A \wedge A)}_B \rightarrow \underbrace{(\Box A \wedge A)}_B \}$

➤ Axiom von GL: $GL \vdash \Box(\Box B \rightarrow B) \rightarrow \Box B$ und somit folgt
 $GL \vdash \Box A \rightarrow \Box \{ \Box(\Box A \wedge A) \rightarrow (\Box A \wedge A) \} \rightarrow \Box(\Box A \wedge A)$

➤ Verwende Thm. 2 und Tautologie $\Box A \wedge A \rightarrow \Box A$: $\Box(\Box A \wedge A) \rightarrow \Box \Box A$

➤ Nun: $GL \vdash \Box A \rightarrow \Box \{ \Box(\Box A \wedge A) \rightarrow (\Box A \wedge A) \} \rightarrow \Box(\Box A \wedge A) \rightarrow \Box \Box A$

➤ Abgekürzt: $GL \vdash \Box A \rightarrow \Box \Box A$ (Axiom von K4) und somit K4 in GL

Die 7 Modallogischen Systeme

- Man kann zeigen, dass sich die Struktur des Diagramms (durch fortfahren mit der „Theorem-Sequenz“) umformen lässt

- Repetition

- K: Hat sonst keine Axiome
- K4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$
- T: $\Box A \rightarrow A$
- S4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$ & $\Box A \rightarrow A$
- B: $\Box A \rightarrow A$ & $A \rightarrow \Box \Diamond A$
- S5: $\Box A \rightarrow A$ & $\Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$
- GL: $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$

Die 7 Modallogischen Systeme

- Man kann zeigen, dass sich die Struktur des Diagramms (durch fortfahren mit der „Theorem-Sequenz“) umformen lässt

- Repetition

- K: Hat sonst keine Axiome
- K4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$
- T: $\Box A \rightarrow A$
- S4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$ & $\Box A \rightarrow A$
- B: $\Box A \rightarrow A$ & $A \rightarrow \Box \Diamond A$
- S5: $\Box A \rightarrow A$ & $\Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$
- GL: $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$

Die 7 Modallogischen Systeme

- Man kann zeigen, dass sich die Struktur des Diagramms (durch fortfahren mit der „Theorem-Sequenz“) umformen lässt

- Repetition

- K: Hat sonst keine Axiome
- K4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$
- T: $\Box A \rightarrow A$
- S4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$ & $\Box A \rightarrow A$
- B: $\Box A \rightarrow A$ & $A \rightarrow \Box \Diamond A$
- S5: $\Box A \rightarrow A$ & $\Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$
- GL: $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$

Mögliche Welten

- Leibniz: Wir leben in der tatsächlichen Welt
 - Unsere Welt ist nur eine von vielen möglichen Welten
- Kripke: Wir können diese Idee auf die Modallogik anwenden
 - Aussagen können in einigen Welten wahr sein, während sie in anderen Welten falsch sind
 - Einige Aussagen können in **allen** möglichen Welten wahr sein (Notwendigkeit)
 - Einige Aussagen können auch nur in **einer** möglichen Welt wahr sein (Möglichkeit)

Mögliche Welten

- Können wir **alle** möglichen Welten sehen?
- Könnten wir dann, wenn wir in anderen Welten leben würden, Welten sehen welche wir jetzt von unserer nicht sehen können?

- Kann es sein, dass man von einer speziellen Welt in eine andere Welt sieht, während dies umgekehrt nicht möglich ist?

Mögliche Welten

➤ Diese *Zugänglichkeit* (accessibility) wirkt sich auf die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Aussage aus

➤ Beispiel:

➤ Welt A: $\Box p$

➤ Welt B: $\Box p$

➤ Welt C: $\Diamond p$

➤ Welt D: $\Diamond p$

(Annahme: R sei reflexiv)

Relationen

- Diese Zugänglichkeit (eine Welt von einer anderen aus sehen) ist eine binäre Relation auf den Welten
- Wir definieren:
 - (1) Sei W die Menge aller Welten
 - (2) Sei R eine *Relation* auf W , wenn für alle x, w gilt wRx , dann gilt x, w in W
 - (3) R ist *reflexiv* auf W , wenn für **alle** w in W : wRw
 - (4) R ist *irreflexiv* auf W , wenn für **kein** w in W : wRw

Relationen

- (5) R ist *antisymmetrisch* auf W, wenn für **alle** w, x in W gilt, dass wenn wRx und auch xRw gilt, dann muss $w=x$
- (6) R ist *transitiv* auf W, wenn für **alle** w, x, y in W gilt, dass wRx und xRy gilt folgt wRy
- (7) R ist *symmetrisch* auf W, wenn für **alle** w, x gilt, dass falls wRx , dann auch xRw
- (8) R ist *euklidisch* auf W, wenn für **alle** w, x, y in W gilt, dass wenn wRx und auch wRy gilt, folgt xRy (bzw. auch yRx)

Bemerkung: R ist eine Äquivalenzrelation auf W, wenn

- R reflexiv auf W
- R symmetrisch auf W
- R transitiv auf W

Definitionen

- Ein *Frame* ist ein geordnetes Paar $\langle W, R \rangle$, wobei W nichtleer und R eine binäre Relation über W ist
 - $\langle W, R \rangle$ ist endlich gdw W endlich ist
 - W ist die *Domäne* von $\langle W, R \rangle$
 - R ist die *Zugänglichkeitsrelation* (accessibility relation)
 - Man sagt $\langle W, R \rangle$ besitzt eine binäre Relation gdw auch R diese besitzt (z.b. $\langle W, R \rangle$ ist transitiv, wenn R transitiv ist)
- Eine *Interpretation* (valuation) V auf W ist eine Relation zwischen Elementen auf W und atomaren Sätzen (sprich V als „verifiziert“)
- Ein Tripel $\langle W, R, V \rangle$ ist ein *Modell*, welches auf dem Frame $\langle W, R \rangle$ basiert
 - Ein Modell besitzt die gleichen Eigenschaften Endlichkeit, Transitivität etc. wie das Frame $\langle W, R \rangle$

Definitionen

- Für jeden Modalsatz A , jedes Modell $M = \langle W, R, V \rangle$ und jede Welt in W definieren wir die Relation: $M, w \models A$
- Diese hat folgende Eigenschaften:
 - (1) Wenn $A = p$ (p atomarer Satz), dann: $M, w \models A$ gdw wVp („In Welt w gilt p “)
 - (2) Wenn $A = \perp$, dann gilt nicht: $M, w \models A$
 - (3) Wenn $A = (B \rightarrow C)$, dann $M, w \models A$ gdw
 - a) Entweder $\neg M, w \models B$
 - b) Oder $M, w \models C$ (und $M, w \models B$)
 - (4) Wenn $A = \Box B$, dann $M, w \models A$ gdw für alle x , für welche gilt wRx , auch gilt $M, w \models B$ (analog wird $A = \Diamond B$ definiert)

Definitionen

- Ein Satz A heisst *wahr* (true) in einer Welt w in einem Modell M , gdw $M, w \models A$
- Ein Satz A heisst *gültig* (valid) in einem Modell $M = \langle W, R, V \rangle$, gdw für alle w in W , A wahr ist in M

Eigenschaften der Modelle

- Es sei M ein Modell und w in W
- Jede Tautologie ist wahr in jeder Welt w in W
- Wenn A und $(A \rightarrow B)$ wahr sind in w , dann ist auch B wahr (Modus Ponens)
- Das Distributionsaxiom $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow \Box A \rightarrow \Box B$ ist wahr in w
- Wenn A gültig ist in M , dann ist auch $\Box A$ gültig in M (Vernotwendigung)
- Daher sind die Theoreme von K (Kripke Semantik) gültig in allen Modellen und folglich auch in allen Frames

Theoreme

➤ **Theorem 5:** $\Box p \rightarrow p$ ist gültig in $\langle W, R \rangle$, gdw R reflexiv auf W

➤ *Beweis:*

(1) Wir nehmen an $\Box p \rightarrow p$ ist gültig in $\langle W, R \rangle$. Sei w eine beliebige Welt in W . Wir wollen zeigen wRw :

- Sei V eine Interpretation auf W s.d. für alle x in W : xVp gdw wRx
- Wenn wRx , dann xVp und somit $M, x \models p$. Also gilt $M, w \models \Box p$
- Durch Annahme $M, w \models \Box p \rightarrow p$, gilt dann $M, w \models p$, also wVp
- Nach Definition von V folgt also wRw

Theoreme

➤ *Beweis:*

(2) Wir nehmen an R ist reflexiv auf W . Sei V eine Interpretation auf W und wir nehmen an x sei in W . Wir wollen zeigen, dass dann $\Box p \rightarrow p$ folgt:

- Wenn $M, w \models \Box p$ für alle x gilt, verlangen wir $M, x \models p$, falls xRw
- Durch die Reflexivität (wRw) folgt dann auch $M, w \models p$
- Somit gilt $M, w \models \Box p \rightarrow p$

Theoreme

- Auf ähnliche Weise beweist man folgende Theoreme:
- **Theorem 6:** $\Box p \rightarrow \Box \Box p$ ist gültig in $\langle W, R \rangle$ gdw R ist transitiv auf W
- **Theorem 7:** $p \rightarrow \Box \Diamond p$ ist gültig in $\langle W, R \rangle$ gdw R ist symmetrisch auf W
- **Theorem 8:** $\Diamond p \rightarrow \Box \Diamond p$ ist gültig in $\langle W, R \rangle$ gdw R ist euklidisch auf W

Theoreme

➤ Theorem 9: (6 Korrektheitstheoreme)

- a) Wenn $K \vdash A$, dann ist A gültig in allen Frames
- b) Wenn $K4 \vdash A$, dann ist A gültig in allen transitiven Frames
- c) Wenn $T \vdash A$, dann ist A gültig in allen reflexiven Frames
- d) Wenn $S4 \vdash A$, dann ist A gültig in allen reflexiven und transitiven Frames
- e) Wenn $B \vdash A$, dann ist A gültig in allen reflexiven und symmetrischen Frames
- f) Wenn $S5 \vdash A$, dann ist A gültig in allen reflexiven und euklidischen Frames

Theoreme

➤ *Beweis: (Theorem 9c)*

- Wir nehmen an $T \vdash A$ und $\langle W, R \rangle$ sei reflexiv
- Mit **Theorem 5** folgt, dass $\Box p \rightarrow p$ gültig ist in $\langle W, R \rangle$
- Weil wir p für A substituieren können, gilt durch $\Box p \rightarrow p$ auch $\Box A \rightarrow A$
- Weil alle Tautologien und das Distributionsaxiom in **allen** Modellen gelten, sind dann alle Axiome von T gültig in $\langle W, R \rangle$
- Da alle Sätze, welche in $\langle W, R \rangle$ gültig sind, geschlossen sind unter Modus Ponens und Vernotwendigung, ist A gültig in $\langle W, R \rangle$

Zusätzliche Definitionen

- Ein Element w einer Menge X wird *R-kleinstes* (R-least) Element von X genannt, wenn xRw für **kein** x in X gilt

- Ein Element w einer Menge X wird *R-grösstes* (R-greatest) Element von X genannt, wenn wRx für **kein** x in X gilt

Zusätzliche Definitionen

- Eine Relation R heisst *wohlfundiert* (wellfounded), wenn es für **jede** nichtleere Menge X ein R -kleinstes Element gibt
- Eine Relation R heisst *umgekehrt wohlfundiert* (converse wellfounded), wenn es für **jede** nichtleere Menge X ein R -grösstes Element gibt
- Bemerkung: Falls R umgekehrt wohlfundiert ist, dann muss R zusätzlich irreflexiv sein
 - Falls wRw gelten würde, dann hätte die nichtleere Menge $X=\{w\}$ kein R -grösstes Element

Weitere Theoreme

- **Theorem 10:** $\Box(\Box p \rightarrow p) \rightarrow \Box p$ ist gültig in $\langle W, R \rangle$ gdw R transitiv und umgekehrt wohlfundiert
- **Theorem 11:** Sei $F = \langle W, R \rangle$ endlich und transitiv, dann ist F irreflexiv, gdw F umgekehrt wohlfundiert ist
- **Theorem 12:** Wenn $GL \vdash A$, dann ist A einerseits
 - (1) In allen transitiven und umgekehrt wohlfundierten Frames gültigund andererseits auch
 - (2) In allen endlichen, transitiven und irreflexiven Frames gültig

Systeme und Frames

Systeme

Gültig in welchen Frames?

K:

In allen

K4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A$

In allen transitiven

T: $\Box A \rightarrow A$

In allen reflexiven

S4: $\Box A \rightarrow \Box \Box A \ \& \ \Box A \rightarrow A$

In allen transitiven und reflexiven

B: $\Box A \rightarrow A \ \& \ A \rightarrow \Box \Diamond A$

In allen reflexiven und symmetrischen

S5: $\Box A \rightarrow A \ \& \ \Diamond A \rightarrow \Box \Diamond A$

In allen reflexiven und euklidischen

GL: $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$

In allen transitiven & umgekehrt wohlfundierten **und**

In allen endlichen, transitiven und irreflexiven

Fragen?